



Dr. Horacio E. Oduber
HOSPITAL



Gipskamer



Onderbeenamputatie



Inleiding

Na een amputatie van het onderbeen wordt er een gipskoker aangelegd. In dit formulier geven we een globaal overzicht van de procedure na de operatie.

Uitleg

Nadat een onderbeen is geamputeerd, moet de patiënt in het gips. Dit heeft drie redenen;

- Bescherming van de wond.
- Zoveel mogelijk stuwing (oedeem) in het onderbeen voorkomen zodat er zich een goede stomp vormt. Dit is belangrijk voor het aanmeten van een prothese.
- Verkorting van de spieren aan de achterzijde van het bovenbeen tegen gaan. Hiermee wordt dwangstand van de knie voorkomen.

Gipskoker

Na amputatie van het onderbeen legt de gipsverbandmeester een aantal dagen na de operatie een koker van gips om de stomp. De knie gaat gestrekt tijdelijk koker in. U komt gedurende 3 weken 2 x per week terug naar de gipskamer. Dit bezoek is nodig voor inspectie van de wond en de stomp. Tijdens het bezoek aan de gipskamer ziet u hoofdzakelijk de gipsverbandmeester. De gipsverbandmeester heeft overleg met de behandelend specialist indien nodig.



Controles

Twee keer per week wordt de gipskoker vervangen. De wond wordt gecontroleerd en er worden foto's gemaakt van de stomp die worden bewaard in een dossier. Aan de hand van de foto's kunnen veranderingen worden waargenomen. Na 3 weken wordt de gipskoker vervangen door een zwachtel. De behandeling wordt vervolgens voortgezet bij de ergotherapie en indien nodig bij de wondenpoli.

Voor meer informatie neem contact met:

Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal
Dr. Horacio E. Oduber Boulevard #1
Gipskamer
Telefoon: 527 4547
www.arubahospital.com

Na 20.00 uur is de bali van de SEH bereikbaar via 527 4000.