

+ Bloedbank



Donante activo



Criterio pa duna sanger

Pa garantiza e bienestar y seguridad di donantenan di sanger, SBA ta traha di acuerdo cu normanan internacional di calidad di produccion di sanger. Esaki ta nifica implementacion di reglanan estricto pa donante di sanger cu ta igual cu esunnan vigente na Merca y Hulanda

E cita:

- e donante ta wordo yama pa un cita
- trece un ID valido;
- yena e lista di pregunta;
- controla si tur datonan personal ta corecto

Pre-Screening

E personal di Bloedbank ta controla si tur e preguntanan ta contesta y por puntra algun pregunta tocante e salud di e donante of si e ta uzando remedi. E nivel di hero ta wordo controla pa medio di un prik den e dede y tambe lo midi e presion. E hero pa hende muhe mester ta 12.0 of mas y pa hende homber 12.5 of mas. E presion mester ta menos cu 180 (bovendruk) y esun di curason menos cu 110 (onderdruk). Si tur cos ta bon por cuminsa cu e donacion di sanger.

Proceso di duna sanger

Lo desinfecta e area den e elleboogploo pa prik un bon ader. (Den cierto ocasion un donante por haya un pleki blauw na unda a prik, pero esey no ta sosode tur ora). Ta dura 5-10 minuut pa e saco di sanger yena. Ta saca solamente 450 ml. di sanger. Ful e proceso ta dura mas o menos 30 minuut. Tin ora un donacion no ta bay bon, p.e e sanger no ta core bon of e ta cuaha (stol). Den un caso asina ta stop e donacion y e donor ta wordo puntra si por prik den e otro brasa. Solamente cu autorisacion di e donante e lo prik den e otro brasa.

Despues di donacion

- E donante ta keda sinta un rato pa controla cu e no ta sigui sangra.
- Despues e donante ta haya un pleister y e por bay sinta den wachtkamer pa bebe y come algo pa e curpa recupera.

No tin riesgo pa duna sanger

No por haya un malesa contagioso door di duna sanger. Hanguanan cu ta wordo uza pa saca sanger ta steriel y desechabel y ta wordo tira afo despues di cada donacion. P' esey nunca dunamento di sanger por tin riesgo door di contaminacion cu cualkier tipo di virus manera Hepatitis of AIDS pa e donante.

Kico mester haci prome duna sanger

- Drumi bon e anochi prome
- Come bon prome cu bin duna sanger
- Evita come cuminda vet prome cu duna sanger, bo curpa ta tarda pa digeri e vet
- Pensa adelanta si tin factornan cu ta impedi bo di duna sanger
- Bin cu nomber di medicina cu bo ta uzando actualmente.

Ki ora no por duna sanger temporalmente

- Griep (te cu 1 siman despues cu bira bon)
- Antibiotica (te cu 2 siman despues cu termina cu e kuur)
- Tattoo, piercing (te cu 4 luna despues cu a pone)

Menstruacion (te cu 1 siman despues cu caba)

- Embaraso
- Operacion chikito (te cu 1 siman despues)
- Operacion grandi (te cu 6 luna despues)
- Hormona pa schildklier

Kico no haci riba e dia di donacion

- Ariba e dia ey bo no mag di haci sport intensivo
- Bo no mag scuba dive of skydive
- Bo no mag di biaha ariba e dia cu bo a duna sanger
- Bebe extra likido pa reemplasa

Kico no haci riba e dia di donacion

- Un hende muhe por duna sanger cada 4 luna y un hende homber cada 2 ½ - 3 luna.

Orario:

Dialuna pa diabierna 8.15 a.m te 4 p.m.

Tur contesta riba pregunta y resultado di testnan cu Bloedbank haci ta confidencial.

Pa mas informacion tuma contacto cu:

Stichting Bloedbank Aruba

Tel: +297-587 4260

E-mail: bloedbank@arubahospital.com